BIOESTADÍSTICA en línea

PROSPECTO R · N.º 2 | DOSIS INICIAL

La Tabla 1 de tu tesis

ÚSALO CUANDO

- Al inicio de los resultados de tu tesis: qui<U+00E9>nes son los participantes.
- Para comparar sus caracter<U+00ED>sticas entre grupos (desenlace o exposici<U+00F3>n).
- Datos sin dise<U+00F1>o muestral complejo (hospital, muestra simple).

CÓMO LEERLO

- Num<U+00E9>ricas: mediana (Q1 <U+2013> Q3); categ<U+00F3>ricas: n (%) dentro de cada columna.
- Variables s<U+00ED>/no: una sola fila con quienes responden <U+00AB>s<U+00ED><U+00BB>.
- La nota al pie dice qu<U+00E9> prueba dio cada valor p: c<U+00F3>piala en m<U+00E9>todos.

CÓDIGO CLAVE

```
library(gtsummary)
theme_gtsummary_language("es", decimal.mark = ",")
tabla_1 <- tbl_summary(datos, by = grupo,
                       label = list(edad ~ "Edad (a<U+00F1>os)"),
                       missing_text = "Sin dato") |>
  add_overall() |> add_p() |> bold_labels()
as_flex_table(tabla_1) |> flextable::save_as_docx(path = "tabla1.docx")
```

HALLAZGO DEL EJEMPLO

ENDES 2024 (muestra, n = 30<U+00A0>825): con presi<U+00F3>n arterial alta, mediana de edad 54 frente a 35 a<U+00F1>os; hombres 59,3<U+00A0>% frente a 40,2<U+00A0>%.

CÓMO REPORTARLO

Se analizaron 30<U+00A0>825 personas de 15 y m<U+00E1>s a<U+00F1>os de la ENDES 2024 con medici<U+00F3>n de presi<U+00F3>n arterial, de las cuales 3<U+00A0>334 (10,8<U+00A0>%) ten<U+00ED>an presi<U+00F3>n arterial alta (Tabla 1).

EVITA

- Valores p en la Tabla 1 de un ensayo aleatorizado.
- Media y DE para variables muy asim<U+00E9>tricas.
- Ocultar los datos faltantes.
- Leer un porcentaje por columna como prevalencia.